

Sikkerhetsoppdatering

Valproinsyre og interaksjon med karbapenemer

April 2010

Tekst til preparatomtale

Avsnitt 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Samtidig bruk av valproinsyre/natriumvalproat og karbapenemer er ikke anbefalt (se avsnitt 4.5).

Avsnitt 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Fall i blodkonsentrasjonen av valproinsyre er rapportert ved samtidig administrasjon av karbapenemer, som førte til en nedgang på 60-100 % av valproinsyrekonsentrasjonen etter omtrent 2 dager. På grunn av den hurtige nedgangen og omfanget av den, regnes ikke samtidig administrasjon av karbapenemer hos pasienter stabilisert på valproinsyrebehandling som en håndterlig interaksjon, og bør derfor unngås (se avsnitt 4.4).

Tekst til pakningsvedlegg

AVSNITT 2: HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER X

Bruk av andre legemidler sammen med X

Vær ekstra nøye med å informere legen eller sykepleieren din dersom du bruker noen av de følgende legemidlene:

Karbapenemer (antibiotika som brukes til å behandle bakterieinfeksjoner). Kombinasjonen av natriumvalproat og karbapenemer bør unngås fordi det kan sette ned virkningen av natriumvalproat.